
Foro Internacional de Reducción de Daños de Espectro Completo

"Nuevos horizontes, procesos emergentes y comunidades organizadas"



Senado de la República 30-11-18





La importancia de programas de salud de reducción del daño con usuarios de otras sustancias psicoactivas.

El caso de dos intervenciones en la Ciudad de México:

- 1.-Tirando Esquina, interviniendo muros de salud.
- 2.-La Trajinera Cannábica.



Tirando Esquina se baso en un estudio epidemiológico binacional (Dr. Valdez, NIDA)

- Alto acceso a la compra de crack en las calles.
- Amplia red social que fomenta practicas sexuales de alto riesgo.
- Alto índice de sexo sin protección.
- Sexo por crack o dinero.
- Multiples parejas.
- Nulo acceso a pruebas de VIH.



Además...

- Exclusión y marginación social,
- Delitos individuales y delincuencia organizada,
- violencia sexual,
- servicios de salud deficientes,
- embarazo en adolescentes, amplia deserción escolar, desempleo,
- falta de servicios indispensables como el agua, luz y drenaje,
- construcción de predios irregulares y vivienda escasa,
- sistema de transporte y de seguridad escasos,
- venta y consumo de droga, y donde,
- 9 de cada 10 usuarios de piedra tienen antecedentes penales.



Publicaciones:



Journal of Psychoactive Drugs



ISSN: 0279-1072 (Print) 2159-9777 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ujpd20

Un Jalón, Un Volteón, y Otra Vez: High-Risk Crack Smoking Paraphernalia in México City

Avelardo Valdez Ph.D., Kathryn M. Nowotny Ph.D., Nalini Negi Ph.D., Eduardo Zafra Mora & Alice Cepeda Ph.D.

To cite this article: Avelardo Valdez Ph.D., Kathryn M. Nowotny Ph.D., Nalini Negi Ph.D., Eduardo Zafra Mora & Alice Cepeda Ph.D. (2016) Un Jalón, Un Volteón, y Otra Vez: High-Risk Crack Smoking Paraphernalia in México City, Journal of Psychoactive Drugs, 48:4, 295-302, DOI: 10.1080/02791072.2016.1198510



International Journal of Drug Policy

Volume 26, Issue 8, August 2015, Pages 739-745



Research paper

Emerging patterns of crack use in Mexico City

Avelardo Valdez^a. ♣ · ➡ , Charles Kaplan^a, Kathryn M. Nowotny^b, Guillermina Natera-Rey^c, Alice Cepeda^a ⊕ Show more

doi:10.1016/j.drugpo.2015.04.010

Get rights and content

Highlights

- · Mexico and other developing countries experiencing increased crack use.
- · Polythetic typology includes dabblers, stable users, crack heads and old heads.
- · Crack patterns self-regulated and less problematic and embedded in everyday life.
- Mexico City's disadvantaged social context explains crack use patterns.
- · Responses to crack in Mexico require distinct tailored health and social responses.

Tirando Esquina

Proyecto de intervención experimental de reducción del daño utilizando Video Mapping, financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates. -Grant #OPP1118561-



Descripción General del Diseño de Investigación

- Se usó el método etnográfico para identificar a los usuarios de crack.
- Uso del mapeo social para identificar áreas de reclutamiento.
- Se utilizó metodología de muestreo adaptativa.
- Alcance intensivo en el campo.
- Evaluación rápida de respuesta (RARE).
- Muestreo dirigido a encuestados.
- La recopilación de datos consistio: mapeo social, entrevistas etnográficas, notas de campo y en la observación participante.

Criterios de inclusión

- Tener 18 años o más.
- Se seleccionaron en el área de Iztapalapa
- Haber reportado consumo en los últimos 30 días.
- No haber estado en tratamiento durante el último mes.



Kit Seguro



Algunos resultados:

- N=58
- 10% mujeres 90% hombres
- Promedio de edad 39 años
- 52% de los encuestados informaron ser encarcelados al menos una vez en su vida.
- 48% han sido hospitalizados al menos una vez en sus vidas.

Frecuencia del uso de drogas en el último mes

Sustancia	% (N=58)
Piedra	100
Marihuana	62
Inhalables	21
Pastillas	12
Cocaína en polvo	5
Alucinógenos	2

Número de veces en tratamiento	%
Nunca (N=57)	47
Una vez (N=57)	26
Más de una vez (N=57)	26
La media del número de veces (N=30)	4
Estancia promedio (N=30)	37 días

Comportamientos sexuales de riesgo (últimos 30 días)

Características	%
Sexualmente activo	71
2 o más parejas	21
Siempre usa condones	11
Nunca usa condones	73

Pruebas e historial de vacunación

Pruebas	%	Número de hace años (media)
VIH	45	3
Hepatitis B	14	3
Hepatitis C	9	2

Vacunación	%
Hepatitis A	14
Hepatitis B	12

Mayor información

https://interviniendomurosdesalud.wordpress.com/

https://www.youtube.com/channel/UCLPmwRfFH1ff92Oy4_cdokg?view_as=subscriber










Algunas consideraciones

Calidad de la cannabis







Extracciones de reciente aparición














Análisis de contenido



Autocultivo







Parafernalia












Comestibles





Riesgos Asociados

- Prácticas culturales
- Tos seca y garganta irritada
- Bronquitis
- Alteraciones de la presión arterial
- Gastritis
- Síndrome de abstinencia
- Cambios de ritmo por sueño y hambre
- Aproximación a territorios psicotrópicos
- Conflictos sociales, laborales, familiares
- Accidentes



Mayor información



Trajinera Cannábica 2018 By Wakko HDC ft The Cora

1,448 views

Li 34 Pl 2 SHARE = SAVE ...

Antropología Visual Published on Jul 30, 2018

ANALYTICS EDIT VIDEO

¡Gracias!

eduardozafra@gmail.com

